

NOTICE D'UTILISATION DU LIQUIDE "SVAPAM" REV. 01 Du 08/06/2013

CETTE NOTICE D'UTILISATION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRODUIT QUI COMPLETENT LES PRECAUTIONS DEJA PRESENTES SUR LE FLACON. A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LES LIQUIDES. CONSERVEZ CETTE NOTICE DANS UN ENDROIT SUR POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE. CES INFORMATIONS N'ONT PAS UN CARACTERE MEDICAL ET NE SONT PAS DESTINEES A REMPLACER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN ET/OU PHARMACIEN.

EN CAS D'URGENCE CONTACTEZ LE CENTRE ANTIPOISON LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

[HTTP://WWW.CENTRES-ANTIPOISON.NET](http://www.centres-antipoison.net)

A TITRE INDICATIF, LE CENTRE ANTIPOISON DE PARIS EST :

HOPITAL FERNAND WIDAL

200 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS

75010 PARIS

TEL : 01.40.05.48.48

DESIGNATION

LE LIQUIDE "SVAPAM" PEUT CONTENIR DE LA NICOTINE AVEC DES CONCENTRATIONS ALLANT DE 04 MG/ML A 24 MG/ML (04 MG/ML, 4 MG/ML, 8MG/ML, 9 MG/ML, 12 MG/ML, 16 MG/ML, 18 MG/ML, 22 MG/ML, 24 MG/ML).

LA QUANTITE DE NICOTINE EST INDIQUEE SUR L'ETIQUETTE DU FLACON.

LA NICOTINE EST UN ALCALOIDE, UNE SUBSTANCE HAUTEMENT TOXIQUE QUI CREE UNE DEPENDANCE ET PEUT ETRE MORTELLE POUR LES ENFANTS SI ELLE EST PRISE EN DOSES SUPERIEURES A 10 MG.

TOUS LES AROMES SONT DISPONIBLES EN CONDITIONNEMENTS DE 10 ML OU 15 ML OU 20 ML OU 30 ML OU 125 ML OU 250 ML, AVEC DES COMPTE-GOUTTES ET BOUCHONS DE SECURITE.

LES LIQUIDES "SVAPAM" NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE DANS LES CIGARETTES ELECTRONIQUES OU DANS DES DISPOSITIFS ELECTRONIQUES SEMBLABLES. LE BUT DE CE PRODUIT EST D'ETRE INHALE PAR VAPEUR. IL NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE BRULE. LORS DE SON UTILISATION, IL SE FORME UN BROUILLARD QUI RESSEMBLE A DE LA FUMEE. BEAUCOUP DE SUBSTANCES CANCEROGENES ASSOCIEES A LA FUMEE DE CIGARETTE TRADITIONNELLE NE SONT PAS PRESENTES DANS CE TYPE DE PRODUIT.

LES LIQUIDES "SVAPAM" OFFRENT UNE ALTERNATIVE POUR CONSOMMER DE LA NICOTINE EN POURCENTAGES VARIABLES.

CE PRODUIT NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LA PEAU. DES AROMES ALIMENTAIRES PEUVENT ETRE AJOUTES A CE LIQUIDE, SELON LES GOUTS.

INDICATIONS ET DOMAINES D'UTILISATION

LES LIQUIDES "SVAPAM" ONT ETE CONCUS POUR UN USAGE DANS LES VAPORISATEURS PERSONNELS. CES LIQUIDES NE SONT NI DES MEDICAMENTS NI DES PALLIATIFS A LA CIGARETTE. ILS NE PEUVENT PAS NON PLUS ETRE UTILISES COMME TRAITEMENT CONTRE UNE MALADIE OU CONDITION PATHOLOGIQUE PREEXISTANTE. C'EST POURQUOI, ILS NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES EN MEME TEMPS QUE D'AUTRES MEDICAMENTS QUI DELIVRENT DE LA NICOTINE (PATCHS, PASTILLES, GOMMES A MACHER ET PRODUITS SIMILAIRES).

LES LIQUIDES "SVAPAM" NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES PAR LES FEMMES ENCEINTES, LES FEMMES PREVOYANT UNE GROSSESSE OU PENDANT L'ALLAITEMENT.

CES PRODUITS NE DOIVENT EN OUTRE PAS ETRE UTILISES PAR LES NON FUMEURS, LES MINEURS (MEME EN DESSOUS DE 18 ANS) ET LES PERSONNES SE TROUVANT EN INCAPACITE PERMANENTE OU TEMPORAIRE.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

LORS DE L'UTILISATION DES LIQUIDES « SVAPAM », CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN SI:

- VOUS SOUFFREZ DE MALADIES CARDIO RESPIRATOIRES, DIABETE, HYPERTENSION,

- ASTHME, PATOLOGIES RENALES, DU FOIE OU DE TROUBLES GASTRO DIGESTIFS (ULCERES ET REFLUX GASTRO OESOPHAGIENS);
- VOUS ETES ALLERGIQUES A L'UN DES COMPOSANTS DU MELANGE OU SI VOUS PENSEZ L'ETRE;
 - VOUS ETES SOUS MEDICAMENTS QUI POURRAIENT INTERFERER AVEC LA NICOTINE;
 - VOUS ETES EN TRAIN DE PRENDRE DE LA NICOTINE PAR PATCH, PASTILLES OU PRODUITS SIMILAIRES ;
 - VOUS ETES EN INCAPACITE PERMANENTE OU TEMPORAIRE;
 - VOUS AVEZ DES DOUTES OU INCERTITUDES SUR L'UTILISATION DE CE PRODUIT,

OU DANS LES CAS OU L'AVIS DE VOTRE MEDECIN EST RECOMMANDE.

REMARQUES :

- EVITER TOTALEMENT LE CONTACT AVEC LA PEAU.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAYER IMMEDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET DU SAVON.
- EN CAS D'IRRITATIONS OU DE MALAISES, CONSULTER UN MEDECIN.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAYER IMMEDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

LE FABRICANT A TOUT MIS EN OEUVRE POUR RENDRE LE CONDITIONNEMENT DE CE LIQUIDE IMPOSSIBLE A OUVRIR POUR LES ENFANTS ET A ESSAYE DE RENDRE CETTE NOTICE LA PLUS CLAIRE ET EXHAUSTIVE POSSIBLE. IL N'Y A CEPENDANT POUR L'INSTANT AUCUNE EVALUATION A LONG TERME FIABLE DES RISQUES ENCOURUS CONCERNANT L'UTILISATION DES LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE. CES PRODUITS SONT PRIS A LA SEULE DISCRETION ET AU RISQUE DE L'UTILISATEUR. NEANMOINS, PAR MESURE DE PRECAUTION, IL EST FORMELLEMENT DECONSEILLE DE PRENDRE PLUS DE 40 MG DE NICOTINE EN 24 HEURES. ET CE, JUSQU'A CE QU'IL Y AIT DES AVANCEES SUR LE SUJET.

DOSAGE LIMITE

IL EST RECOMMANDE DE NE PAS DEPASSER LES DOSES QUOTIDIENNES SUIVANTES CORRESPONDANT A 40 MG DE NICOTINE (EN 24 HEURES):

- POUR LES LIQUIDES DE 4 MG/ML- DOSAGE MAX 10 ML (ENVIRON 200 GOUTTES)*
- POUR LES LIQUIDES DE 8 MG/ML- DOSAGE MAX 5 ML (ENVIRON 100 GOUTTES)*
- POUR LES LIQUIDES DE 9 MG/ML- DOSAGE MAX 5 ML (ENVIRON 100 GOUTTES)*
- POUR LES LIQUIDES DE 12 MG/ML- DOSAGE MAX. 3.3 ML (ENVIRON 66 GOUTTES)
- POUR LES LIQUIDES DE 16 MG/ML- DOSAGE MAX. 2.5 ML (ENVIRON 50 GOUTTES)
- POUR LES LIQUIDES DE 18 MG/ML- DOSAGE MAX. 2.2 ML (ENVIRON 44 GOUTTES)
- POUR LES LIQUIDES DE 22 MG/ML- DOSAGE MAX 1.8 ML (ENVIRON 36 GOUTTES)
- POUR LES LIQUIDES DE 24 MG/ML- DOSAGE MAX 1.6 ML (ENVIRON 32 GOUTTES)

*EN TOUT ETAT DE CAUSE IL EST RECOMMANDE DE NE PAS DEPASSER 4ML DE LIQUIDE PAR JOUR, C'EST-A-DIRE 80 GOUTTES.

LES CONSEQUENCES DU SURDOSAGE DE NICOTINE SONT:

- NAUSEES, SALIVATIONS, DOULEURS ABDOMINALES, DIARHEES, SUDORATIONS, MAUX DE TETE, VERTIGES, TROUBLES DE L'AUDITION.

EN PRESENCE D'UN OU PLUSIEURS DE CES SYMPTOMES OU EN CAS DE SUSPICION DE SURDOSAGE, CESSER L'UTILISATION DU PRODUIT ET CONSULTER UN MEDECIN.

LA TOXICITE DE LA NICOTINE COMME COMPOSANT DU TABAC EST RECONNUE. LES SYMPTOMES TYPQUES D'UNE INTOXICATION AIGUE SONT:

- ☞ POULS FAIBLE ET IRREGULIER, DIFFICULTE A RESPIRER ET CONVULSIONS

GENERALISEES.

IL EST RECONNU QUE LA NICOTINE EST GENOTOXIQUE.

LES EFFETS CANCEROGENES DU TABAC SONT PRINCIPALEMENT LIES A LA COMBUSTION DE SES PRODUITS.

CES PRODUITS NE SONT PAS PRESENTS DANS LE LIQUIDE.

DOMMAGES COLLATERAUX

LA NICOTINE PAR INHALATION PEUT PARFOIS CAUSER LES EFFETS SUIVANTS :

- 🕒 TOUX, MAUX DE TETE, IRRITATION DE LA BOUCHE ET DE LA GORGE, CONGESTION NASALE, APHTE ULCEREUX, MAUX DE GORGE, ANXIETE, DEPRESSION, MALAISE, NAUSEES, BOUCHE SECHE, BRULURES D'ESTOMAC, DOULEURS ARTICULAIRES, DIARRHEE, BALLONNEMENTS, ALLERGIE (ROUGEURS, ESSOUFFLEMENTS, DIFFICULTE A RESPIRER, SENSATION D'OPPRESSION DANS LA POITRINE, GONFLEMENT DU VISAGE, DE LA LANGUE, DES LEVRES), SENSATION DE SOIF, SANGLOTS, DOULEURS THORACIQUES, FIEVRE, RHYTME CARDIAQUE IRREGULIER OU ACCELERE, ETOURDISSEMENTS, SOMNOLENCE.

SI VOUS RENCONTERZ UN OU PLUSIEURS DE CES SYMPTOMES, TOUT EN UTILISANT LE LIQUIDE "SVAPAM", CESSEZ L'UTILISATION ET CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONSULTER VOTRE MEDECIN EN PRESENCE DE N'IMPORTE QUEL SYMPTOME INHABITUEL, MEME S'IL N'EST PAS DANS LA LISTE PRECEDENTE.

LA NICOTINE EST TOXIQUE QUAND ELLE EST AVALEE OU ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU.

SI LE PRODUIT ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER ABONDAMMENT A L'EAU ET CONSULTER UN MEDECIN.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAVER AVEC DU SAVON ET DE L'EAU ET CONSULTER UN MEDECIN.

EN CAS D'INGESTION ACCIDENTELLE, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN EN LUI MONTRANT CETTE NOTICE ET LE FLACON.

LES SYMPTOMES TYPIQUES D'EMPOISONNEMENT AIGU DERIVANT DE LA NICOTINE INCLUENT CONVULSIONS, DIFFICULTE A RESPIRER ET POULS FAIBLE ET IRREGULIER. DANS CE CAS IL EST RECOMMANDE DE SUSPENDRE L'UTILISATION DU LIQUIDE ET DE CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

MODE D'EMPLOI

AGITER LE LIQUIDE AVANT L'UTILISATION, INTRODUIRE LE LIQUIDE "SVAPAM" DANS LE RESERVOIR DU DISPOSITIF ELECTRONIQUE PAR LE CONTENEUR APPROPRIE, EN FAISANT ATTENTION A NE PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LE LIQUIDE OU A NE PAS LE DISPERSER DANS L'ENVIRONNEMENT. APRES UTILISATION, REFERMER SOIGNEUSEMENT LE CONDITIONNEMENT ET CONSERVER LE LIQUIDE DANS UN ENDROIT FERME A CLE, HORS DE PORTEE DES ENFANTS, A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 25°C ET LOIN DES SOURCES DE LUMIERE DIRECTE. NE PAS CONSOMMER AU-DELA DE LA DATE D'ECHEANCE INDIQUEE, MEME SI LE CONDITIONNEMENT N'A JAMAIS ETE OUVERT.

JETER LE PRODUIT INUTILISE DANS LES POINTS DE COLLECTE DES MEDICAMENTS PERIMES.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE PRUDENCE

IL EST RECOMMANDE L'ACHAT ET L'UTILISATION DE DISPOSITIFS ELECTRONIQUES CERTIFIES ET GARANTIS, DONT L'ENTRETIEN DOIT ETRE EFFECTUE EN SUIVANT SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

IL EST RECOMMANDE DE REMPLACER REGULIEREMENT LES CARTOUCHES ET LES EMBOUTS DE CES DISPOSITIFS.

L'UTILISATION DE CES PRODUITS DANS DES APPAREILS NON CONFORMES ET NON CERTIFIES EST FORMELLEMENT INTERDITE.

LIQUIDE DE BASE SANS NICOTINE:

NON DANGEREUX. UNE UTILISATION MODEREE ET RESPONSABLE EST RECOMMANDEE.

LIQUIDE AVEC 0.4%, 0.8%, 0.9% DU POIDS EN NICOTINE (**NICOTINE <1% DU POIDS**):

RISQUES :

R21: NOCIF PAR CONTACT AVEC LA PEAU.

NOCIF SI AVALE.

CONSEILS :

S27: ENLEVER IMMEDIATEMENT LES VETEMENTS CONTAMINES.

S36/37: UTILISER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES.

S45: EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN (SI POSSIBLE, MONTRER L'ETIQUETTE).

S63: EN CAS D'INHALATION, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

S25: EVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX.

LIQUIDE AVEC 1.2%, 1.6%, 1.8%, 2.2%, 2.4% DU POIDS EN NICOTINE (**NICOTINE ENTRE 1% ET 5% DU POIDS**):

RISQUES :

R24: TOXIQUE PAR CONTACT AVEC LA PEAU.

R51-53: TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, PEUT PROVOQUER A LONG TERME DES EFFETS NEGATIFS SUR LE MILIEU AQUATIQUE.

R22: NOCIF SI AVALE.

CONSEILS :

S27: ENLEVER IMMEDIATEMENT LES VETEMENTS CONTAMINES.

S36/37: UTILISER UN VETEMENT DE PROTECTION ET DES GANTS APPROPRIES.

S45: EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. (SI POSSIBLE, LUI MONTRER L'ETIQUETTE).

S63: EN CAS D'ACCIDENT PAR INHALATION, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

S25: EVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX.

COMPOSITION CHIMIQUE

LIQUIDE –CONCENTRATIONS DE NICOTINE: 4 MG/ML, 8 MG/ML, 9 MG/ML (NICOTINE <1% DU POIDS):

LIQUIDE DE BASE NEUTRE SANS NICOTINE

100 G DE PRODUIT CONTIENNENT:

- 50.0 G DE PROPYLENEGLYCOLE,
- 40.0 G DE GLYCERINE VEGETALE,
- 10.0 G D'EAU STERILE APYROGENE.

LIQUIDE DE BASE AVEC AROME SANS NICOTINE

100 G DE PRODUIT CONTIENNENT:

- 50.0 G PROPYLENEGLYCOLE,
- 40.0 G DE GLYCERINE VEGETALE,
- 9.5 G D'EAU STERILE APYROGENE
- 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

LIQUIDE AVEC 0,4% DU POIDS EN NICOTINE

100 G DE PRODUIT CONTIENNENT:

- 46.1 G DE PROPYLENEGLYCOLE,
- 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE
- 8.2 G D'EAU STERILE APYROGENE

- 0.4 G DE NICOTINE
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).
- LIQUIDE AVEC 0,8% DU POIDS EN NICOTINE*
- 100 G DE PRODUIT CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLICOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 8.0 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 0.8 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

- LIQUIDE AVEC 0,9% DU POIDS EN NICOTINE*
- 100 G DE PRODUIT CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLICOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 7.9 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 0.9 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

**LIQUIDE – GRADUATION 12 MG/ML, 16 MG/ML, 18 MG/ML, 22 MG/ML, 24 MG/ML
(NICOTINE ENTRE 1% ET 5% DU POIDS)**

- LIQUIDE AVEC 1,2% DU POIDS EN NICOTINE:*
- 100 G DE MELANGE CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLICOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 7.6 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 1.2 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

- LIQUIDE AVEC 1,6 % DU POIDS EN NICOTINE:*
- 100 G DE MELANGE CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLICOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 7.2 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 1.6 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

- LIQUIDE AVEC 1,8% DU POIDS EN NICOTINE:*
- 100 G DE MELANGE CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLYCOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 7.0 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 1.8 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

- LIQUIDE AVEC 2,2% DU POIDS EN NICOTINE:*
- 100 G DE MELANGE CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLYCOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 6.6 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 2.2 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

- LIQUIDE AVEC 2,4% DU POIDS EN NICOTINE:*
- 100 G DE MELANGE CONTIENNENT:
- 46.0 G DE PROPYLENEGLICOLE,
 - 44.7 G DE GLYCERINE VEGETALE,
 - 6.4 G D'EAU STERILE APYROGENE,
 - 2.4 G DE NICOTINE,
 - 0.5 G D'AROME (SELON L'AROME CHOISI).

FABRICANT

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE: CASAMI S.R.L.

SIEGE LEGAL: VIA CRISTOFORO COLOMBO 13 – CAP 84018– SCAFATI (SA)

TEL.: +39 081 8565333 EMAIL: INFO@SVAPAM.IT

RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION

RAISON SOCIALE: CASAMI S.R.L.

SIEGE LEGAL: VIA CRISTOFORO COLOMBO 13 – CAP 84018– SCAFATI (SA)

TEL.: +39 081 8565333 EMAIL: INFO@SVAPAM.IT

CONTROLE DE LA QUALITE

LA PRODUCTION EST FAITE AVEC UN SYSTEME DE QUALITE COMPLET EN CONFORMITE
AUX NORMES UNI EN ISO 9001:2008 ET AVEC LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE
FABRICATION (GMP).